


Holdvurdering

Holdvurdering er et nyttig verktøy for å bedre fruktbarheten.



Til vurdering av dyras hold brukes en metode med en skala fra 1 (meget dårlig hold) til 5 (svært overfeit) med intervall på 0,25 poeng.

Det anbefales som et minimum å bedømme kyrne i følgende faser i laktasjonen:

Ved avsining, ved kalving, i tidlig laktasjon, i midtlaktasjon og eventuelt i senlaktasjon.


Dette vil gi en holdprofil som blir retningsgivende for riktig fôring. Ved kalving bør holdet være 3,25 – 4. Best hold på de mest høyttytende kan være gunstig. Tap av hold bør bare skje de første 4–6 ukene etter kalving, og maksimalt tap bør ikke overskride 0,75 poeng. Ingen kyr bør ha hold under 2,5 når energibalansen er stabilisert omkring 3 måneder etter kalving. Fra ca 3 måneder etter kalving er det viktig å føre slik at holdet øker gradvis fram mot sinperioden. Stabilt hold på 3,25 – 4 i sintida synes gunstigst. Denne holdprofilen (se figuren) er retningsgivende for NRF-kyr i konvensjonell drift.


I økologisk drift anbefales noe lavere grenser (omkring 0,5 holdpoeng) for maksimum- og minimumshold.

Viktige hjelpemidler i fôrstyringa:

1. Grovfôranalyse
2. Fôrplan og én dags fôrkontroll
3. Urea- og acetonprøver
4. Holdvurdering

Anbefalt holdprofil for NRF-kyr





Holdpoeng 2,0

Rygg/ryggtakker:

Hver enkelt ryggtakk tydelig

Området mellom ryggtakker og sidetakker:


Tydelig innsunken

Hoftekroker og setebeinsknoker:

Utstående og kantete

Halegropa:

Framstående knokler, U-formet rom under halerota



Holdpoeng 2,5

Rygg/ryggtakker:

Skarp, utstående rygglinje

Området mellom ryggtakker og sidetakker:


Tydelig konkav bue

Hoftekroker og setebeinsknoker:

Noe utstående og litt kantete

Halegropa:

Uthulet, men tendens til fettavleiring



Holdpoeng 3,0

Rygg/ryggtakker:

Noe avrundet rygglinje

Området mellom ryggtakker og sidetakker:

Lett konkav bue

Hoftekroker og setebeinsknoker:

Jevne, ikke kantete

Halegropa:

Avrundede knokler, grunn halegrop med noe fettavleiring



Holdpoeng 3,5

Rygg/ryggtakker:

Avrundet rygglinje, ryggtakkene er ikke tydelige

Området mellom ryggtakker og sidetakker:


Svak konkav bue, nesten jevn helling

Hoftekroker og setebeinsknoker:

Tildekket med noe fett

Halegropa:

Avrundede knokler, grunn halegrop med tydelig fettavleiring



Holdpoeng 4,0

Rygg/ryggtakker:

Flat, ingen ryggtakk tydelig

Området mellom ryggtakker og sidetakker:

Nesten flat

Hoftekroker og setebeinsknoker:

Avrundet med noe fett

Halegropa:

Avrundet, utfyllt med fett. Antydning til vevsfold ved halefeste



Holdpoeng 4,5

Rygg/ryggtakker:

Flat, tydelig fettlag

Området mellom ryggtakker og sidetakker:

Svak konveks bue

Hoftekroker og setebeinsknoker:

Betydelig fettfylde

Halegropa:

Knokler tildekket, gjemt i fett, tydelige vevsfolder